



La chronique ovine

Ténia : avant l'immunité, la plus grande vigilance

Les signes cliniques du ténia sont bien connus. Les agneaux à l'herbe présentent un mauvais état général avec un déficit de croissance qui peut atteindre 50 %. Des troubles digestifs, une laine sèche et cassante sont également visibles. Les agneaux manquent de vigueur, avec une anémie possible. Le risque d'entérotaxémie est alors considérablement accru. Laurent Saboureau, vétérinaire à l'Alliance Pastorale, explique que « *les agneaux se contaminent dès les premiers brins d'herbe ingérés, en avalant un acarien, l'oribate, qui est l'hôte intermédiaire du ténia. Cet oribate est sensible à la sécheresse mais résiste à l'hiver. Il est donc présent dès la mise à l'herbe et les agneaux en ingèrent rapidement des centaines, dont certains sont porteurs de larves infestantes de ténia. Ces larves vont se fixer dans l'intestin grêle de l'agneau et se développer en ténias adultes qui deviendront pondueurs en 30 à 40 jours* ».

Un traitement spécifique efficace

« *Le traitement médicamenteux est réalisé par administration d'un médicament spécifique du ténia à base de praziquantel, à partir de 5 semaines après la sortie à l'herbe ou le début de la consommation effective d'herbe, poursuit le vétérinaire. Le renouvellement du traitement, 5-6 semaines après la première administration, peut être nécessaire. On peut aussi avoir recours en cas de poly-parasitisme à un produit polyvalent ténia-strongles à base d'un benzimidazole, ou associer l'administration le praziquantel et à celle d'une molécule d'une autre famille d'anthelminthique* ». Bien prendre l'avis de son vétérinaire sur le dosage adapté au traitement du ténia et ne pas sous-estimer le poids des agneaux est très important dans la réussite du traitement. Aucun traitement n'étant ovicide, laisser ensuite les agneaux 12 heures en bergerie ou sur leur ancienne pâture avant de les changer de parcelle est également fortement conseillé.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la vidéo « le ténia du jeune agneau » et le podcast « radio ovin n°3 » sur ciirpo.idele.fr et www.inn-ovin.fr.



Photo : Les premiers signes cliniques peuvent apparaître sur les agneaux dès 5 à 6 semaines après la mise à l'herbe

CP : CIIRPO

Laurence Sagot, Institut de l'Élevage/ CIIRPO
Gaïane Seychal, Inosys réseau d'élevage Ovin viande