

Les actualités de la semaine:

Les journées clémentes de la semaine dernière font avancer considérablement les sommes de températures de telles sortes qu'aujourd'hui tout le département dépasse les 200° sur la base 01/02. Ainsi même sur les zones les plus hautes et sous conditions de portance, les chantiers de fertilisation doivent-êtr d'actualité.


Les quelques pluies des jours passés vont rendre rapidement efficace les apports de lisiers et d'azotes minéraux réalisés ces derniers jours, notamment sur les zones à plus de 800m d'altitude. A titre de comparaison, et bien que 2022 ne soit pas une année remarquable, il y a actuellement 1 semaine d'avance par rapport à l'an dernier sur ces zones. Les premières mise à l'herbe devraient pouvoir intervenir la première décade d'avril. Un peu plus bas, attention à bien être réactif dans la gestion de son herbe, la dynamique pourrait-êtr bonne mais d'éventuelles gelées matinales pourront encore venir ternir le tableau. Si tel est le cas, veuillez à faire un époinçage rapide des parcelles concernées afin de redynamiser la pousse. Avec une croissance de 20kg de MS/Ha/jr, il faudra ajuster le chargement afin de conserver une herbe de qualité!

Prairie fertile et	Précoce et assez Précoce	Tardive
	RG, dactyle,	Fléole, Pâturin,...
Départ en végétation	200/250	350/400
1 ^{er} Tour	250/300	700/750
fin de déprimage	500	900
début épiaison (Ensilage, enrub, ...)	700/750	1200
floraison (foin tardif, ...)	1000	1500

Enfin en plaine, les transitions alimentaires doivent s'accroître afin de coller au plus proche de la pousse de l'herbe. Adapter le temps de présence des animaux et préserver les réserves des plants est une priorité pour ne pas compromettre la réussite de sa saison d'herbe.

Un peu plus de temps dehors si la croissance est bonne, et seulement quelques heures en cas de ralentissement pour ne jamais descendre en dessous de 5 cm d'herbe (hauteur cheville) et ainsi assurer une bonne reprise de pousse. Seule les prairies fortes en dactyle et féтуque peuvent-êtr rasées afin de limiter l'effet « touffes ».

Ca se passe près de chez vous:



Suivi de parcelles: top départ!


Les suivis de parcelles doivent attaquer avec un regard à porter en priorité sur les prairies précoces et fertiles! Sur les prairies de RG semées en fin d'été dernier, et récoltées à l'automne, la dynamique est bonne. Sur la commune de Malrevers par exemple : une première coupe fin octobre 2022, puis épandage de 20m3 de lisier. Fertilisation minérale apporté fin février et aujourd'hui les Ray-grass sont à stade montaison – épis 5cm.



Sommes de températures par station, base 01/02

Repères thermiques et stades végétatifs:

500°	Fin de déprimage
250°	Mise à l'herbe
200° base 01/02	Départ en végétation
200° base 01/01	Début de la fertilisation



Les repères thermiques:

	Plaine < 500m	Demi-montagne 500 – 900m	Plateaux d'altitudes 900 – 1200m	Montagne > 1200m
Données fournies par Météo France à partir des stations météo:	Fontannes	Monistrol / Loire Chaspuzac	Saugues ; Félines ; Fix-St-Geney ; Le Mazet-St-Voy ; Landos	Les Estables
Somme de température 01/01 (°C):	501	393	286	203
Somme de température 01/02 (°C):	366	295	221	165
Gain de la semaine (°C)	+ 78	+ 66	+ 54	+ 44
Pluviométrie cumulée 2023 (mm)	54 (+5)	98 (+11)	104 (+12)	135 (+11)