

la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION
Liberté
Égalité

La **Chambre d'Agriculture** de **Haute-Loire** est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de **conseil indépendant phytopharmaceutique**, sous le **N°IF01762** dans le cadre de l'agrément multi sites porté par l'APCA.

## Les actualités de la semaine:

La relative chaleur observée durant la fin de semaine dernière a pour effet de faire avancer rapidement les cumuls de températures et donc le stade des graminées. Les croissances observées restent encore timides du fait des nuits froides voire même des gelées matinales. Une adaptation différente suivant la zone est à prendre: En plaine, si le stock d'herbe sur pied est limitant, il est encore possible de faire déprimer quelques parcelles de fauche avant le repère des 500°. Attention cependant, sur les prairies précoces, d'ici 8-10 jours il sera trop tard! Passé les 500°, il s'agira alors d'un étêtage et les repousses ne seront plus que feuillues. La qualité en sera améliorée mais cela se traduira par une moindre récolte en quantité.

Autour des 800m d'altitude, avec le retour de précipitations, l'herbe pourrait connaître sa première croissance notable. Le pâturage devra s'accentuer pour coller au plus proche de l'offre. Envisager de faire le tour des parcelles pour définir l'ordre de pâturage et ne pas hésiter à faire tourner les animaux très rapidement pour


ménager le sol!

Prairie fertile et	Précoce et assez Précoce	Tardive	
Traine tertile et	RG, dactyle,	Fléole, Pâturin,	
Départ en végétation	200/250	350/400	
1 <sup>Er</sup> Tour	250/300	700/750	
fin de déprimage	500	900	
début épiaison (Ensilage , enrub,)	700/750	1200	
floraison (foin tardif,)	1000	1500	

Sur les plateaux d'altitude, les premières mises à l'herbe vont intervenir sans plus tarder. Préserver son sol et une transition alimentaire progressive restent une règle d'or. Ainsi restez très progressif et ne descendez pas en dessous des 5 à 6 cm de hauteur d'herbe pour assurer un retour de pousse rapide et conséquent. Quelques heures de sortie l'après-midi pour faire ingérer rapidement les pointes seraient l'idéal et permettraient de dynamiser la croissance en régénérant les feuilles ayant été trop impactées par le froid. Enfin, en montagne, la fertilisation des prairies pourra rependre dès que les conditions météo le permettront, notamment vis-à-vis de la portance des sols.

Les repères thermiques:	Plaine < 500m	Demi-montagne 500 – 900m	Plateaux d'altitudes 900 – 1200m	Montagne > 1200m
Données fournies par Météo France à partir des stations météo:	Fontannes	Monistrol / Loire Chaspuzac	Saugues ; Félines ; Fix- St-Geneys ; Le Mazet-St- Voy ; Landos	Les Estables
Somme de température 01/01 (°C):	571	451	329	234
Somme de température 01/02 (°C):	436	353	264	195
Gain de la semaine (°C)	+ 70	+ 59	+ 43	+ 31
Pluviométrie cumulée 2023 (mm)	65 (+11)	111 (+13)	120 (+16)	154 (+19)





## Repères thermiques et stades végétatifs:

The first limit li	500°	Fin de déprimage	
	250°	Mise à l'herbe	
	200° base 01/02	Départ en végétation	
Market	200° base 01/01	Début de la	

En moyenne altitude, la clémence de la semaine passée a permis une avancée conséquente du stade végétatif: les Ray-grass ont atteint le stade

épis 10 cm. La bonne gelée de mardi dernier n'a pas été trop impactante puisque que seulement

quelques pointes ont noirci.



Contact: MOUNIER Patrice / GACHET Jérôme 06 11 69 96 64