

## Les actualités de la semaine:

Gelées matinales et timides précipitations ont rythmé cette semaine. Les croissances de l'herbe restent modestes pour la saison, mais le retour de températures plus douces dans les jours qui arrivent devra inciter à l'anticipation et permettra peut-être de faire enfin monter les sucres et ainsi de gagner en valeurs alimentaires.


En dessous de 800m d'altitude: la croissance des graminées précoces reste modérée mais il faudra être vigilant, le stade montaison pourrait rapidement laisser place à l'épiaison. Prenez le temps de faire le tour des parcelles, notamment de RG pour évaluer les niveaux d'avancements: les chantiers de récolte pourront se prévoir. Une stratégie qui sera à adapter en fonction de la date d'implantation, la fertilisation apportée et l'alternativité des variétés choisies. Pour la conduite de pâturage, la période de déprimage doit maintenant être achevée sous peine de compromettre les quantités d'herbe récoltées. Avant de réduire les compléments à l'auge, assurez-vous d'avoir une dizaine de jours d'avances sur l'herbe pâturée.

Sur les plateaux d'altitude: Les troupeaux doivent maintenant tous être lâchés pour permettre un tour rapide sur l'ensemble du parcellaire en restant vigilant sur les transitions alimentaires et les hauteurs de sorties. Le déprimage des parcelles de fauche étant possible, il faut en profiter pour ép pointer les feuilles ayant gelées afin de

redynamiser la pousse à venir. Faire le tour des surfaces et établir son prévisionnel de pâturage permettront également de mettre en place les premiers décalages de pousse entre les parcelles, gage de valeurs alimentaires préservées. Pour cela, alternez entre les parcelles de fauches et celles uniquement de pâtures pour revenir à un stade optimal sur l'ensemble des paddocks le prochain tour.

En montagne: les mises à l'herbe précoces pourront se réaliser cette semaine sous réserve d'avoir suffisamment de surfaces accessibles pour compenser le stock sur pied encore faible. Restez généreux sur les fourrages distribués à l'auge pour ne pas sur-solliciter les parcelles. Sous conditions de portances, les chantiers de fertilisation sur les prairies les moins précoces pourront se poursuivre.

## Ca se passe près de chez vous:



## Les végétaux comme repère!

### Repères thermiques et stades végétatifs:

700°	Epiaison des graminées précoces
500°	Fin de déprimage
250°	Mise à l'herbe
200° base 01/02	Départ en végétation

### Les stades de l'herbe et observations locales

- 300° jour : floraison du Forsythia → mise à l'herbe
- 500° : floraison des cerisiers → fin de déprimage
- 500 à 600° : floraison des pissenlits → étêtage des graminées
- 600° à 800° : floraison des lilas et pissenlits blancs
  - montaison des fétuques et dactyles
  - Epiaison des graminées précoces (RGA, Vulpin)
- 800 à 1000° : Epiaison des fétuques et dactyles. Montaison des fléoles
  - Floraison des graminées précoces (vulpin, ray grass)

### Les repères thermiques:

	Plaine < 500m	Demi-montagne 500 – 900m	Plateaux d'altitudes 900 – 1200m	Montagne > 1200m
Données fournies par Météo France à partir des stations météo:	Fontannes	Monistrol / Loire Chaspuzac	Saugues ; Félines ; Fix-St-Geney ; Le Mazet-St-Voy ; Landos	Les Estables
Somme de température 01/01 (°C):	684	543	395	278
Somme de température 01/02 (°C):	549	445	330	239
Gain de la semaine (°C)	+ 68	+ 56	+ 38	+ 26
Pluviométrie cumulée 2023 (mm)	75 (+9)	131 (+ 20)	138 (+16)	177 (+22)