

N° 12 du 4 mai 2020

AU SOMMAIRE

- Pluie et chaleur au rendez-vous: conditions réunies pour une forte croissance de l'herbe.

Chambre d'Agriculture
de Haute-Loire
Immeuble Interconsulaire
16, Bd Bertrand
43012 Le Puy-en-Velay
04.71.07.21.00
Contact @ :
bdaudet@haute-loire.chambagri.fr
A consulter dès le mardi sur
www.haute-loire.chambres-agriculture.fr

Rédigé par
Bernard Daudet,
Conseillers à la Chambre
D'Agriculture de Haute-Loire



1 - Cumul des températures au 03 mai 2020 et pluviométrie

→ Cumul des températures :

Lieu	Fontannes	Monistrol S Loire	Chaspuzac	Saugues	Félines	Fix St Geneys	Mazet St Voy	Landos	Les Estables
Altitude	435 m	777 m	833 m	945 m	1020m	1102m	1130m	1148m	1350 m
Cumul des températures au 03 05 20 (base 0 °C au 1 ^{er} Février)	Plaine < à 600 m	Demi - Montagne De 600 à 850 m		Plateaux d'altitude De 850 à 1100 m		Montagne De 1100 à 1250 m			Hte M. > à 1250m
	898 °C	787 °C	686 °C	608 °C	539 °C	616 °C	589 °C	535 °C	444 °C
Gain de la Semaine N°18	101°C	81 °C	82 °C	77 °C	70 °C	65 °C	66 °C	67C	53 °C
<i>Rappel cumul Moyen 2008/2018 au 5 mai</i>	719°C	582 °C	521°C	412 °C	370°C	405°C	359 °C	340°C	242 °C

(Source des données : Météo France)

En plaine, en dessous de 600 m, le cumul de température au 3 mai 2020 est de 898 °C à Fontannes. En demi-montagne, entre 600 et 850 m, le cumul de température est entre 686 °C à Chaspuzac et 787 °C à Monistrol s/ Loire.

Sur les plateaux et montagnes, le cumul des températures oscille entre 608 °C à Saugues et 535 °C à Landos.

Depuis le 1^{er} février, le cumul de température est très largement excédentaire par rapport aux données normales observées entre 2008 et 2018. C'est un excédent de l'ordre de 200 °C sur l'ensemble du département, avec par exemple, + 179 °C à Fontanes, + 205 °C à Monistrol sur Loire, ou encore + 196 °C à Saugues et + 202 °C aux Estables.

→ Cumul de la pluviométrie de la semaine dernière (du 27/04 et le 03/05/ 2020)

La répartition des pluies sous formes orageuses de la semaine dernière est inégalement répartie sur le département, comme le montre le tableau ci-dessous. Mais cet arrosage est le bienvenue.

Info Prairie est un bulletin hebdomadaire pour vous accompagner dans la gestion de la pousse de l'herbe avec les conditions de l'année et optimiser les interventions sur les surfaces fourragères de votre exploitation.

La Chambre d'Agriculture de Haute-Loire est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant phytopharmaceutique, sous le N°IF01762 dans le cadre de l'agrément multi sites porté par l'APCA.



Données météo :
Source Météo France

Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours du Casdar et des fonds Européens



Ce bulletin est réalisé à partir des observations réalisées sur le département de la Haute-Loire, ainsi que des expérimentations menées lors des années précédentes.

Chambre d'Agriculture
de Haute-Loire
Immeuble Interconsulaire
16, Bd Bertrand
43012 Le Puy-en-Velay
04.71.07.21.00
Contact @ :
bdaudet@haute-loire.chambagri.fr
A consulter dès le mardi sur
www.haute-loire.chambres-agriculture.fr

Rédigé par
Bernard Daudet,
Conseillers à la Chambre
D'Agriculture de Haute-Loire

Cumul des précipitations des 7 derniers jours entre le 27/04 et le 03/05/ 2020 (L./m ²)								
Chaspuzac	Les Estables	Felines	Fix st genest	Fontanne	Landos	Mazet St Voy	Monistrol S/Loire	Saugues
43.7	77.8	84.4	61.6	28.7	21.8	61.4	26.7	23.8

2 -Cumuls de températures et stades repères pour l'apport d'azote et le pâturage

LE SAVIEZ-VOUS ?

500 °C : arrêter le déprimage sous peine de réduire le rendement

550 °C : le premier tour pour les laitières doit être fini.

700 °C : le premier tour pour tous les animaux pâturant doit s'achever.

1000°C : début des foins.



La **Chambre d'Agriculture de Haute-Loire** est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de **conseil indépendant phytopharmaceutique**, sous le **N°IF01762** dans le cadre de l'agrément multi sites porté par l'APCA.



Données météo :
Source Météo France


Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours du Casdar et des fonds Européens



Ce bulletin est réalisé à partir des observations réalisées sur le département de la Haute-Loire, ainsi que des expérimentations menées lors des années précédentes.

3 -Évolution de la quantité d'herbe disponible entre deux pâturages : l'herbe pâturée est le fourrage le plus simple et le moins cher pour nourrir le troupeau. L'objectif est de faire pâturer au stade 3 feuilles des graminées, pour avoir la meilleure appétence et valeur alimentaire. A l'épi, c'est trop tard !

T brut d'herbe disponible/ha



Le graphique ci-dessus indique la courbe de croissance de l'herbe : elle dépend de la température et de la période de l'année : rapide au printemps, elle se ralentit l'été. Au printemps, 18-25 jours suffisent souvent pour atteindre les 3 feuilles, alors qu'en été il faudra attendre 2 à 3 fois plus longtemps pour le même rendement.

Info Prairie est un bulletin hebdomadaire pour vous accompagner dans la gestion de la pousse de l'herbe avec les conditions de l'année et optimiser les interventions sur les surfaces fourragères de votre exploitation.

**Chambre d'Agriculture
de Haute-Loire**
Immeuble Interconsulaire
16, Bd Bertrand
43012 Le Puy-en-Velay
04.71.07.21.00
Contact @ :
bdaudet@haute-loire.chambagri.fr
A consulter dès le mardi sur
www.haute-loire.chambres-agriculture.fr

Rédigé par
Bernard Daudet,
Conseillers à la Chambre
D'Agriculture de Haute-Loire



La **Chambre d'Agriculture de Haute-Loire** est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de **conseil indépendant phytopharmaceutique**, sous le **N°IF01762** dans le cadre de l'agrément multi sites porté par l'APCA.



Données météo :
Source Météo France

Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours du Casdar et des fonds Européens



Ce bulletin est réalisé à partir des observations réalisées sur le département de la Haute-Loire, ainsi que des expérimentations menées lors des années précédentes.

3 -Conseils :

- **En plaine :** les ensilages doivent se terminer et les fenaisons peuvent débuter dès que possible.
- **En demi-montagne :** débuter et poursuivre rapidement les ensilages pour bénéficier d'un fourrage de qualité jusqu'au stade début épiaison.
- **Sur les plateaux et montagne :** Le stade début épiaison sera atteint dans moins de 8 jours : à ce stade 10% des épis sont visibles. Il indique le début des fauches précoces pour l'ensilage.
- **En haute montagne :** terminer le déprimage des près de faucher et poursuivre le pâturage uniquement sur les parcelles destinées à la pâture.

**** BULLETIN INFO PRAIRIE ET MAÏS : parution chaque semaine à partir du mardi soir.**
<https://extranet-haute-loire.chambres-agriculture.fr/cultures/fourrages/conduite-des-surfaces-fourrageres/info-prairie/>