

N° 13 du 12 mai 2020

AU SOMMAIRE

Début du mois de mai : Conditions favorables à la croissance de l'herbe

Chambre d'Agriculture
de Haute-Loire
Immeuble Interconsulaire
16, Bd Bertrand
43012 Le Puy-en-Velay
04.71.07.21.00
Contact @ :
bdaudet@haute-loire.chambagri.fr
A consulter dès le mardi sur
www.haute-loire.chambres-agriculture.fr

Rédigé par
Bernard Daudet,
Conseillers à la Chambre
D'Agriculture de Haute-Loire



La **Chambre d'Agriculture de Haute-Loire** est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de **conseil indépendant phytopharmaceutique**, sous le **N°IF01762** dans le cadre de l'agrément multi sites porté par l'APCA.



Données météo :
Source Météo France

Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours du Casdar et des fonds Européens



Ce bulletin est réalisé à partir des observations réalisées sur le département de la Haute-Loire, ainsi que des expérimentations menées lors des années précédentes.

1 - Cumul des températures au 10 mai 2020 et pluviométrie

➔ Cumul des températures :

Lieu	Fontannes	Monistrol S Loire	Chaspuzac	Saugues	Félines	Fix St Geneys	Mazet St Voy	Landos	Les Estables
Altitude	435 m	777 m	833 m	945 m	1020m	1102m	1130m	1148 m	1350 m
Cumul des températures au 10 05 20 (base 0 °C au 1 ^{er} Février)	Plaine < à 600 m	Demi - Montagne De 600 à 850 m		Plateaux d'altitude De 850 à 1100 m		Montagne De 1100 à 1250 m			Hte M. > à 1250m
Gain de la Semaine N°19	1017 °	898 °C	786 °C	704 °C	627 °C	713 °C	680 °C	620 °C	522 °C
	119 °C	111 °C	100 °C	77 °C	63 °C	70 °C	63 °C	60 °C	44 °C

(Source des données : Météo France)

En plaine, en dessous de 600 m, le cumul de température au 10 mai 2020 est de 1 017 °C à Fontannes.

En demi-montagne, entre 600 et 850 m, le cumul de température est entre 786 °C à Chaspuzac et 898 °C à Monistrol s/ Loire.

Sur les plateaux et montagnes, le cumul des températures oscille entre 704 °C à Saugues et 620 °C à Landos.

➔ Cumul de la pluviométrie du 1^{er} mai au 10 mai 2020

Cumul des précipitations de la première décade de mai 2020 (L./m ²)								
Chaspuzac	Les Estables	Felines	Fix st geney	Fontanne	Landos	Mazet St Voy	Monistrol S/Loire	Saugues
35.1	43.3	65.1	44.4	27.7	8.4	49.6	14.1	13.8

Les prévisions météorologiques annoncées pour la semaine du 11 au 17 mai 2020 sont pluvieuses.

Info Prairie est un bulletin hebdomadaire pour vous accompagner dans la gestion de la pousse de l'herbe avec les conditions de l'année et optimiser les interventions sur les surfaces fourragères de votre exploitation.

**Chambre d'Agriculture
de Haute-Loire**
Immeuble Interconsulaire
16, Bd Bertrand
43012 Le Puy-en-Velay
04.71.07.21.00
Contact @ :
bdaudet@haute-loire.chambagri.fr
A consulter dès le mardi sur
www.haute-loire.chambres-agriculture.fr

Rédigé par
Bernard Daudet,
Conseillers à la Chambre
D'Agriculture de Haute-Loire



La **Chambre d'Agriculture de Haute-Loire** est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de **conseil indépendant phytopharmaceutique**, sous le **N°IF01762** dans le cadre de l'agrément multi sites porté par l'APCA.



Données météo :
Source Météo France

Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours du Casdar et des fonds Européens



Ce bulletin est réalisé à partir des observations réalisées sur le département de la Haute-Loire, ainsi que des expérimentations menées lors des années précédentes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

500 °C : arrêter le déprimage sous peine de réduire le rendement

550 °C : le premier tour pour les laitières doit être fini.

700 °C : le premier tour pour tous les animaux pâturant doit s'achever.

650°C à 700°C : ensilage herbe précoce Ray Grass Italie et Hybrides


750°C : ensilage Dactyle, Ray Grass Anglais, Fétuque, Luzerne, prairies multi-espèces, P.N.

1000°C : début des foins précoces

2 - Conseil pâturage

Evolution des valeurs alimentaires de l'herbe au cours d'une repousse (source Institut de l'élevage **idele**).

Les valeurs alimentaires indicatives sont exprimées en fonction de la hauteur d'herbe mesurée avec l'herbomètre, soit à moins de 9 cm, entre 9 et 12 cm et entre 13 et 15 cm.



Ce graphique montre une nette dégradation de la qualité quand l'herbe dépasse les 12 cm. Pour le pâturage, l'herbe comprise entre 9 et 12 cm de hauteur offre le meilleur rapport quantité / qualité. Au-delà de 13 cm, la valeur nutritive chute.

3 – Conseil récolte :

Dès le retour des conditions météo favorables à la récolte de l'herbe prévoir les foins en plaines, poursuivre les ensilages sur les plateaux et en montagne.

**** BULLETIN INFO PRAIRIE ET MAÏS : parution chaque semaine à partir du mardi soir.** <https://extranet-haute-loire.chambres-agriculture.fr/cultures/fourrages/conduite-des-surfaces-fourrages/info-prairie/>

Info Prairie est un bulletin hebdomadaire pour vous accompagner dans la gestion de la pousse de l'herbe avec les conditions de l'année et optimiser les interventions sur les surfaces fourragères de votre exploitation.