

N° 8 du 7 avril 2020

AU SOMMAIRE

- Pousse de l'herbe au ralenti : gelées nocturnes fréquentes et manque de précipitation en cause !

Chambre d'Agriculture
de Haute-Loire
Immeuble Interconsulaire
16, Bd Bertrand
43012 Le Puy-en-Velay
04.71.07.21.00
Contact @ :
bdaudet@haute-loire.chambagri.fr
A consulter dès le mardi sur
www.haute-loire.chambres-agriculture.fr

Rédigé par
Bernard Daudet,
Conseillers à la Chambre
D'Agriculture de Haute-Loire



1 -Cumul des températures au 5 avril 2020 et pluviométrie

Lieu	Fontannes	Monistrol S Loire	Chaspuzac	Saugues	Félines	Fix St Geneys	Mazet St Voy	Landos	Les Estables
Altitude	435 m	777 m	833 m	945 m	1020m	1102m	1130m	1148m	1350 m
Cumul des températures au 5 avril 20 (base 0 °C au 1 ^{er} Février)	Plaine < à 600 m	Demi - Montagne De 600 à 850 m		Plateaux d'altitude De 850 à 1100 m		Montagne De 1100 à 1250 m			Hte M. > à 1250m
	507 °C	431 °C	369 °C	320 °C	264 °C	313 °C	294 °C	266 °C	203 °C
Gain de la Semaine N°14	44 °C	39 °C	29 °C	25 °C	18 °C	30 °C	27 °C	21 °C	19 °C

(Source des données : Météo France)

* Les températures de la semaine dernière sont caractérisées pas des gelées nocturnes fréquentes. Pour les prévisions des prochains jours, cela devrait s'estomper et les cumuls de températures devraient grimper.

* Le manque précipitation se poursuit, les prévisions des prochains jours sont plutôt peu pluvieuses.

2 -Cumuls de températures et stades repères pour l'apport d'azote et le pâturage

200 °C	350 °C	300 °C	500 °C
-Azote sur parcelles fauche précoce ensilage et pâture	-Azote sur parcelles fauche tardive foin	-Mise à l'herbe précoce, -Préconisée pour profiter de la qualité de la pousse d'herbe	-Fin du premier tour de pâturage, -Fin du déprimage sur les parcelles destinées à la fauche tardive en foin

La Chambre d'Agriculture de Haute-Loire est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant phytopharmaceutique, sous le N°IF01762 dans le cadre de l'agrément multi sites porté par l'APCA.



Données météo :
Source Météo France

Programme Régional Autonome
fourrage Avec le concours
du Casdar et des fonds Euro-
péens



Ce bulletin est réalisé à partir des observations réalisées sur le département de la Haute-Loire, ainsi que des expérimentations menées lors des années précédentes.

**Chambre d'Agriculture
de Haute-Loire**
Immeuble Interconsulaire
16, Bd Bertrand
43012 Le Puy-en-Velay
04.71.07.21.00
Contact @ :
bdaudet@haute-loire.chambagri.fr
A consulter dès le mardi sur
www.haute-loire.chambres-agriculture.fr

Rédigé par
Bernard Daudet,
Conseillers à la Chambre
D'Agriculture de Haute-Loire



La **Chambre d'Agriculture de Haute-Loire** est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de **conseil indépendant phytopharmaceutique**, sous le **N°IF01762** dans le cadre de l'agrément multi sites porté par l'APCA.



Données météo :
Source Météo France

Programme Régional Autonome fourrage Avec le concours du Casdar et des fonds Européens



Ce bulletin est réalisé à partir des observations réalisées sur le département de la Haute-Loire, ainsi que des expérimentations menées lors des années précédentes.

3 -Conseils : Les gelées nocturnes cumulées à un vent orienté Nord et le manque de pluie ralentissent la pousse de l'herbe.

LE SAVIEZ-VOUS ?

- 250 °C :** lâcher les laitières quelques heures pour préparer la transition alimentaire.
- 300 °C :** lâcher des herbivores qui ne rentrent plus, compléter avec râtelier.
- 350 °C :** tous les troupeaux doivent être sortis, apport d'azote en altitude pour le foin.
- 500 °C :** arrêter le déprimage sous peine de réduire le rendement
- 550 °C :** le premier tour pour les laitières doit être fini.
- 700 °C :** le premier tour pour tous les animaux pâturant doit s'achever.

En plaine, en dessous de 600 m, le cumul de température au 5 avril est de 507 °C à Fontannes.

Le cumul des 500 °C est atteint, il est temps de terminer le premier tour du pâturage et le déprimage des parcelles destinées à la fauche tardive en foin. Le repère du stade des ensilages se situe à partir de 650 -700 °C cumulés. Faire le tour des parcelles à ensiler prochainement, notamment des temporaires à base de Ray Grass pour surveiller le stade début épiaison (10 % des épis visibles).

En demi-montagne, entre 600 et 850 m, le cumul de température au 5 avril est entre 369 °C à Chaspuzac et 431 °C à Monistrol s/ Loire. Le stock d'herbe sur pied est faible.

Sur les plateaux et montagnes : le cumul des températures oscille entre 320 °C à Saugues et 266 °C à Landos.

En attendant le retour des pluies pour dynamiser la pousse de l'herbe, quelles solutions ?

- Commencer et/ou poursuivre la mise à l'herbe sur les parcelles prévues en pâturage.
- Respecter le rythme conseillé de 21 à 25 jours pour effectuer un tour des parcelles à pâturer.
- Prévoir un affouragement pour compléter les besoins des troupeaux.

Repères pour la pâture : l'optimum d'entrée de parcelle correspond à de l'herbe au niveau du bas des mollets. On parle alors d'une hauteur de 12cm « herbomètre », du nom de l'outil qui évalue la hauteur et la densité de l'herbe.

Correspondance entre « repère à la botte » et « hauteur à l'herbomètre »

Repère à la botte	À la semelle	Au talon	À la cheville	Mi-botte
Hauteur herbomètre	2 cm	5 cm	10 cm	15 cm



5 cm



10 cm



15 cm

**** BULLETIN INFO PRAIRIE ET MAÏS :** parution chaque semaine à partir du mardi soir.
<https://extranet-haute-loire.chambres-agriculture.fr/cultures/fourrages/conduite-des-surfaces-fourrageres/info-prairie/>

Info Prairie est un bulletin hebdomadaire pour vous accompagner dans la gestion de la pousse de l'herbe avec les conditions de l'année et optimiser les interventions sur les surfaces fourragères de votre exploitation.