

N° 9 du 14 avril 2020

AU SOMMAIRE

- Déficit pluviométrique très marqué : moins de 5 L / m² ces 4 dernières semaines.
- la pousse de l'herbe est stoppée et la quantité de fourrage sur pied dans les prairies est faible.

Chambre d'Agriculture
de Haute-Loire
Immeuble Interconsulaire
16, Bd Bertrand
43012 Le Puy-en-Velay
04.71.07.21.00
Contact @ :
bdaudet@haute-loire.chambagri.fr
A consulter dès le mardi sur
www.haute-loire.chambres-agriculture.fr

Rédigé par
Bernard Daudet,
Conseillers à la Chambre
D'Agriculture de Haute-Loire



1 -Cumul des températures au 12 avril 2020 et pluviométrie

➔Cumul des températures :

Lieu	Fontannes	Monistrol S Loire	Chaspuzac	Saugues	Félines	Fix St Geneys	Mazet St Voy	Landos	Les Estables
Altitude	435 m	777 m	833 m	945 m	1020m	1102m	1130m	1148m	1350 m
Cumul des températures au 5 avril 20 (base 0 °C au 1 ^{er} Février)	Plaine < à 600 m	Demi - Montagne De 600 à 850 m		Plateaux d'altitude De 850 à 1100 m		Montagne De 1100 à 1250 m			Hte M. > à 1250m
	592 °C	521 °C	438 °C	376 °C	324 °C	392 °C	372 °C	329 °C	263 °C
Gain de la Semaine N°15	84 °C	90 °C	69 °C	56 °C	60 °C	79 °C	78 °C	63 °C	60 °C

(Source des données : Météo France)

En plaine, en dessous de 600 m, le cumul de température au 12 avril est de 592 °C à Fontannes. En demi-montagne, entre 600 et 850 m, le cumul de température est entre 438 °C à Chaspuzac et 521 °C à Monistrol s/ Loire. Sur les plateaux et montagnes, le cumul des températures oscille entre 376 °C à Saugues et 329 °C à Landos.

➔Pluviométrie : Les précipitations sont quasiment nulles depuis les 4 dernières semaines. Sur la période du 12 mars au 12 avril, c'est moins de 5 L / m² sur les 9 stations météorologiques observées ci-dessus, hors mis Les Estables ou les dernières pluies remontent au 22/23 mars avec un cumul de 10 l / m². Le déficit pluviométrique est encore plus marqué que 2019 sur l'ensemble du département.

La Chambre d'Agriculture de Haute-Loire est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant phytopharmaceutique, sous le N°IF01762 dans le cadre de l'agrément multi sites porté par l'APCA.




Données météo :
Source Météo France

Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours du Casdar et des fonds Européens



Ce bulletin est réalisé à partir des observations réalisées sur le département de la Haute-Loire, ainsi que des expérimentations menées lors des années précédentes.



**Chambre d'Agriculture
de Haute-Loire**
Immeuble Interconsulaire
16, Bd Bertrand
43012 Le Puy-en-Velay
04.71.07.21.00
Contact @ :
bdaudet@haute-loire.chambagri.fr
A consulter dès le mardi sur
www.haute-loire.chambres-agriculture.fr

Rédigé par
Bernard Daudet,
Conseillers à la Chambre
D'Agriculture de Haute-Loire

2 -Cumuls de températures et stades repères pour l'apport d'azote et le pâturage

200 °C	350 °C	300 °C	500 °C
-Azote sur parcelles fauche précoce ensilage et pâture	-Azote sur parcelles fauche tardive foin	-Mise à l'herbe précoce, -Préconisée pour profiter de la qualité de la pousse d'herbe	-Fin du premier tour de pâturage, -Fin du déprimage sur les parcelles destinées à la fauche tardive en foin



LE SAVIEZ-VOUS ?

250 °C : lâcher les laitières quelques heures pour préparer la transition alimentaire.

300 °C : lâcher des herbivores qui ne rentrent plus, compléter avec râtelier.

350 °C : tous les troupeaux doivent être sortis, apport d'azote en altitude pour le foin.

500 °C : arrêter le déprimage sous peine de réduire le rendement

550 °C : le premier tour pour les laitières doit être fini.

700 °C : le premier tour pour tous les animaux pâturant doit s'achever.

La **Chambre d'Agriculture de Haute-Loire** est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de **conseil indépendant phytopharmaceutique**, sous le **N°IF01762** dans le cadre de l'agrément multi sites porté par l'APCA.



Données météo :
Source Météo France

Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours du Casdar et des fonds Européens



Ce bulletin est réalisé à partir des observations réalisées sur le département de la Haute-Loire, ainsi que des expérimentations menées lors des années précédentes.



3 -Conseils :

Pour toutes les zones du département : le stock d'herbe sur pied est faible et la croissance de l'herbe est quasiment stoppée par le manque d'eau. L'affouragement des troupeaux est à maintenir.

Espérons que les pluies annoncées dans les prévisions météorologiques des prochains jours permettront de corriger cette station.

**** BULLETIN INFO PRAIRIE ET MAÏS :** parution chaque semaine à partir du mardi soir.
<https://extranet-haute-loire.chambres-agriculture.fr/cultures/fourrages/conduite-des-surfaces-fourrageres/info-prairie/>

Info Prairie est un bulletin hebdomadaire pour vous accompagner dans la gestion de la pousse de l'herbe avec les conditions de l'année et optimiser les interventions sur les surfaces fourragères de votre exploitation.